

## Notice Wartec-Warticon

### **TRAITEMENT DES CONDYLMES ACUMINES:**

#### **Propriétés & Indications:**

La podophylotoxine est un extrait végétal doté de propriétés antivirales.

Elle est utilisée contre les verrues génitales situées sur le pénis chez l'homme et sur les grandes lèvres chez la femme.

#### **Contre indications:**

- Hypersensibilité aux produits.
- Plaie ouverte.
- Grossesse, allaitement.

#### **Précautions d'emploi:**

Eviter le contact avec les yeux après application du produit.

Avant l'application du produit, laver l'endroit concerné à l'eau et au savon, puis appliquer du point du doigt une quantité suffisante pour couvrir chaque verrue.

#### **Effets indésirables:**

Irritation, une sensibilité ou douleur peut apparaître le 2<sup>ème</sup> ou le 3<sup>ème</sup> jour du traitement, lorsque les verrues commencent à disparaître.

Dans la plupart des cas, ces effets secondaires sont légers et passagers.

#### **Posologie & mode d'administration:**

- Avant l'application, laver l'endroit à traiter à l'eau et au savon; sécher soigneusement.
- Pour mieux voir l'endroit à traiter, il est possible d'utiliser le miroir accompagnant la crème.
- Appliquer du bout du doigt une quantité suffisante de crème pour couvrir chaque verrue. Bien faire pénétrer la crème.
- Veiller à n'appliquer la crème que sur les verrues car elle contient une substance active qui peut être toxique en cas de contact prolongé avec la peau saine. En cas de contact de la crème avec la peau saine, laver à l'eau et au savon.
- Laver soigneusement les mains après chaque application. Appliquer la crème 2 fois/j (matin et soir) pendant 3 jours puis respecter une pause de 4 jours (= 1 cycle de traitement). Si les verrues n'ont pas disparu 7 jours après le début du traitement, répéter le cycle 3 jours de traitement à 2 applications par jour puis 4 jours sans traitement.
- Ne pas dépasser 4 cycles de traitement.
- En présence de verrues d'une taille  $> 4 \text{ cm}^2$  (environ la taille d'un timbre), il est préférable que le traitement ait lieu sous surveillance médicale.

#### **Conditionnement et Contenance:**

Boîte contenant: Un tube de 5 g de crème à 0,15%

Un petit miroir.