

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Doxycyklin 2care4 100 mg tabletter**

doxycyklinmonohydrat

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### **I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Doxycyklin 2care4 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Doxycyklin 2care4
3. Hur du använder Doxycyklin 2care4
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Doxycyklin 2care4 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1 Vad Doxycyklin 2care4 er och vad det används för**

Doxycyklin 2care4 är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.

Doxycyklin 2care4 används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftvägssjukdom (bronkit), Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxycyklin 2care4 används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit önskad effekt.

#### **2 Vad du behöver veta innan du använder Doxycyklin 2care4**

##### **Använd inte Doxycyklin 2care4**

Om du är allergisk mot doxycyklin, tetracykliner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du använder Doxycyklin 2care4

- om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken.
- om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna).

Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxycyklin 2care4 på bestämd ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.

På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning, även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst 5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.

Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

### **Andra läkemedel och Doxycyklin 2care4**

Tala om för läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxycyklin 2care4:

- antacida (för behandling av sura uppstötningar)
- järnmedicin
- kinapril (mot högt blodtryck)
- didanosin (mot virusinfektioner)
- atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)
- antibakteriella läkemedel som innehåller penicillin

Följande läkemedel kan minska effekten av Doxycyklin 2care4 om de tas samtidigt:

- kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxycyklin 2care4)
- rifampicin (mot tuberkulos)
- fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)
- Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller esomeprazol (minskar produktionen av saltsyra i magsäcken)

Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levera sig) ska du tala med din läkare innan du använder Doxycyklin 2care4, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

### **Doxycyklin 2care4 med mat, dryck och alkohol**

Effekten av Doxycyklin 2care4 kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

Effekten av Doxycyklin 2care4 påverkas inte av mat.

### **Graviditet och amning**

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxycyklin 2care4 under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.

Doxyferm går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Doxycyklin 2care4 under amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Doxycyklin 2care4 har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **3 Hur du använder Doxycyclin 2care4**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta tablettarna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla i magen (se även avsnitt 2: Doxycyklin 2care4 med mat, dryck och alkohol).

Svälj tablettarna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att samtliga korn sväljs.

Ligg inte ner då du tar tablettarna.

#### **Doseringsanvisning**

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

*Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:* Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen.

Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta fall med en dos dagligen.

Redan efter ett par dagars behandling med Doxycyklin 2care4 kan tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är *mycket viktigt att du fortsätter behandlingen* enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Doxycyklin 2care4**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att ta Doxycyklin 2care4**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

### **4 Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.

*Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)*

: Illamående, kräkningar, diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta Doxycyklin 2care4 tillsammans med mat.

*Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):* Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

*Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):* Överkänslighetsreaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), nagelavlossning, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika svårighetsgrad, förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), inflammation i tjocktarmen.

*Okänd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):* Nagelavlossning orsakad av överkänslighet mot solljus, svart hårig tunga, läkemedelsreaktion som kan yttra sig som feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstörade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom).

Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinna kan ibland uppstå beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller upplevs som svåra, kontakta läkare.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.  
webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5 Hur Doxycyklin 2care4 förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6 Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin per tablett.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, renat vatten.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Tablett: grågul, rund och kupad med skåra på ena sidan.  
Blister: 10, 16, 20, 30 respektive 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla  
förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Importör/Ompackare:**

2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark,  
Tel. 08 – 68 40 98 40

**Tillverkare:**

Merckle GmbH, Blaubeuren  
Tyskland

**Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-12-14**